



ПОЧЕМУ НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Наиболее быстрый и эффективный способ взять вирус под контроль - это вакцинация. Чем больше людей имеет иммунитет к вирусу тем быстрее он перестаёт циркулировать в человеческой популяции.

Кому нужно прививаться?



Приоритетная группа - лица, по роду своей деятельности контактирующие с большим количеством людей и подверженные высокому риску инфицирования (медработники, учителя, работники соцзащиты).

Можно ли заболеть от прививки?

Вакцина не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19 поэтому заболеть от прививки невозможно.

Что нужно делать после вакцинации?

Особенных ограничений после вакцинации нет. В течение нескольких дней после прививки можно воздержаться от посещения сауны, бани, избегать чрезмерных физических нагрузок, не давить и не тереть место инъекции, чтобы не спровоцировать усиление местной реакции.

Можно ли прививаться переболевшим COVID-19 ранее?

Инструкция к вакцине не запрещает вакцинацию лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию ранее. Но переболевшие COVID-19 могут отложить вакцинацию на 3-6 месяцев.

Что делать, если заболел после первой прививки?

Делать ли вторую дозу?

Если в период после первой дозы вакцины против коронавирусной инфекции вы заболели каким-либо инфекционным заболеванием, например ОРВИ, то согласно инструкции вакцинацию нужно отложить до выздоровления (до нормализации температуры при лёгком течении) или на 2-4 недели (в зависимости от состояния, это определит врач). Но нужно быть уверенным, что это не коронавирусная инфекция. В случае если вы заболели коронавирусной инфекцией, то вторая доза вакцины следует отложить на 3-6 месяцев после выздоровления.

Помните, после вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики - носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

